

Chaves de *Clitocybe sensu stricto*

		epítetos
1.	Espécies de tamanho médio a grande, centro do chapéu carnudo, nalguns casos formando umbo largo	2 (Subgénero <i>Disciformis</i> p.p.)
1.	Espécies de tamanho pequeno a médio, chapéu ± deprimido, francamente higrófanos e/ou cobertura pruinosa	6 (Subgénero <i>Pseudolyophyllum</i>)
2.	Odor ± anisado, se não cor verde não higrófono, chapéu glabro ou pruinoso para a margem	Secção <i>Odorae</i> <i>odora subalutacea viridis</i>
2.	Tons esbranquiçados a ocráceo ou rosado, se odor aromático forte e esbranquiçado então diâmetro < 3 cm ou lâminas espaçadas	3 (Secção <i>Candicantes</i> p.p.)
3.	Chapéu glabro, quando muito dando a impressão de ter uma "geada" a cobrir	Subsecção <i>Pseudocandicantes</i> + <i>aspropaxilloides ericeticola</i> (graminicola=agrestis)
3.	Cobertura glaceada ou pruinosa	4 <i>gyrans krizii-josephii nebularis opala robusta</i>
4.	Odor aromático forte	Subsecção <i>Pseudofragrantes</i> <i>albofragrans anisata cistophila erubescens luffii rivulosoides subanisata</i>
4.	Odor nulo, banal ou desagradável	5
5.	Espécies gráceis, com hifas diverticuladas na cutícula (Stirpe <i>rivulosa</i> p.p. e Subsecção <i>Candicantes</i> = <i>Leucocybe</i> e <i>Neoclitocybe alnetorum</i> mas também <i>Clitoc. dryadicola</i>)	
5.	(Subsecção <i>Pruinatae</i>) Espécies gráceis, hifas na cutícula quando muito bifurcadas ou coralóides	Stirpe <i>rivulosa</i> p.p. <i>augeana dealbata mucoroides paludosa rivulosa truncicola</i>
5.	(Subsecção <i>Pruinatae</i>) Espécies robustas, com ou sem hifas diverticuladas na cutícula	Stirpe <i>cerussata</i> <i>martiorum ornamentalis phyllophila phyllophila</i> var. <i>fusispora</i>
6.	Lâminas brancas ou pálidas, não acinzentadas	7 (Secção <i>Epruinatae</i>)
6.	Lâminas acinzentadas	10 (Secção <i>Pseudolyophyllum</i>)
7.	Odor anisado, aromático, frutado	Subsecção <i>Fragrantes</i> <i>danica fragrans harmajae hebelomoides kuehneri marginella obsoleta obsoleta</i> f. <i>subrugulosospora percomis?</i> <i>suaveolens subpellucida</i>
7.	Odor nulo, banal, farináceo	8 (Subsecção <i>Epruinatae</i>)

8	Cores ± escuras, odor quando muito farináceo		<i>brumalis brumalis</i> var. <i>straminea</i> <i>diosma nuoljae subdryadicola</i>
9	Cores pálidas (sem reflexo róseo) e esporos > 5(6) µm	Stirpe <i>nitrophila</i>	<i>elegantula fragilipes fulvonitens</i> (<i>nitrophila</i> = <i>amarescens</i>) <i>wielandii</i>
9	Cores bege, castanho claro, alutáceo, esporos < 4–5(6) µm	Stirpe <i>angustissima</i>	<i>agrestis amarella angustissima applanata dionysae metrodii subpellucida winterhoffii</i>
9	Cores rosadas ou castanho couro, esporos < 4–5(6) µm	Stirpe <i>diatrete</i>	<i>diatrete laricicola leucodiatrete paxillus salmona subbulbipes</i>
10	Odor distintivo	11	
10	Odor nulo ou banal (fúngico)	12	
11	Odor farináceo, rançoso, ou a pepino	Subsecção <i>Ditopae</i>	<i>ditopa haasiana menthiodora</i> (<i>mortuosa</i> = <i>metachroa</i>) <i>pausiaca quercina vibecina vibecina</i> var. <i>langei</i> (<i>vibecina</i> var. <i>pseudoobata</i> = <i>subcordispora</i>)
11	Odor terroso (e sabor amarelento) ou frutado, fétido-nitroso, a peixe	Subsecção <i>Fritilliformes</i>	<i>amarescens atrostriata festivoides foetens fuligineipes pruniadora</i>
12	Chapéu plano ou convexo de início, esporos em geral cianófilos	13	
12	Chapéu em funil ou umbilicado desde o início	14	
13	Base do pé estrigosa, margem estriada	15	
13	Base do pé quando muito feltrada	Subsecção <i>Orbiformes</i>	<i>aquosoumbrina favrei festiva metachroa pseudodicolor submetachroa</i>
14	Esporos pequenos e largos (Q < 1,5)	Subsecção <i>Latisporinae</i>	<i>singeri globispora subcordispora</i>
14	Esporos oblongos, Q cerca de 1,7 a 2,0	15	
15	Base do pé estrigosa, chapéu pode ser plano ou convexo de início, margem estriada, esporos cianófilos	Subsecção <i>Strigipedes</i>	<i>concava fennica lohjaensis strigosa</i>
15	Base do pé glabra, eventualmente com micélio ou rizóides, margem do chapéu banal, esporos acianófilos	Subsecção <i>Cyathiformes</i>	<i>lituus subspadicea subumbilicata umbilicata</i>