

Chaves para secções do género *Mycena*

(sic Courtecuisse & Duhem, com adições)

Pé exsudando látex aquoso: grupo Lactipedes e *M. abramsii*

— Aresta das lâminas corada: Luculentae, Pterigenae, Rubromarginatae, Supinae, Fragilipedes e *M. pelianthina*

— Cores vivas, esporos não amilóides (ou pouco), lâminas ascendentes pelo menos inicialmente: Adonidae, Aciculae

— Chapéu < 1 cm Ø — Base do pé em forma de disco, chapéu viscoso: Basipedes

— Pé com muco muito espesso: *M. rorida*

— Chapéu víscido, lâminas ascendentes, base do pé azul: Viscipelles

— Delicado, revestimento pulverulento (como açúcar), lâminas ascendentes sublivres: Sacchariferae

— Lâminas adnatas, pruinoso, esporos amilóides: Supinae (cortícola), Polyadelphia (folicola)

— Cores pálidas (quanto muito castanho), esporos não-amilóides: Hiemales

— Chapéu > 1 cm Ø — Pé azulado, pruinoso, lâminas ascendentes, esporos amilóides: Amictae

— Pé resistente, na base pubescente, chapéu liso ou estriado, higrófano, lâminas ascendentes a horizontais sinuadas, esporos amilóides: Mycena

— Esporos amilóides — Lâminas decurrentes, mais ou menos sinuadas, chapéu viscoso: Calamophilae, Cinerellae, Fuliginellae

— Lâminas ascendentes — Ventrudas — Chapéu viscoso, cutícula separável, aresta das lâminas gelificada: Hygrocyboideae

— Chapéu seco, cistídeos clavados com "escova" regular, pé frequentemente pruinoso: Filipedes

— Chapéu castanho ou cinzento frequentemente higrófano, pé concolor: Fragilipedes

— Sinuadas, chapéu acinzentado: Cinerellae

— Lâminas ± horizontais, espaçadas — Porte colibióide, pé frágil, chapéu higrófano: Calodontes

— Lâminas subhorizontais, sobre folhas: Polyadelphia

— Esporos não-amilóides — Lâminas ± horizontais, espaçadas, porte colibióide, pé frágil, chapéu higrófano: Calodontes

— Lâminas não-horizontais, cores pálidas (quanto muito castanho): Hiemales